

## **Violencia de la pareja contra la mujer durante la gestación y el postparto. Estudio multicéntrico en Latinoamérica**

Multicenter study in Latin America: Violence against women by intimate partners during pregnancy and postpartum

Loreto Pantoja Manzanarez<sup>1\*</sup> <https://orcid.org/0000-0002-9294-6228>

Maribel Mella Guzmán<sup>1</sup> <https://orcid.org/0000-0003-1567-9362>

Lorena BinfaEsbir<sup>1</sup> <https://orcid.org/0000-0002-2336-3379>

Alicia Carrasco Parra<sup>1</sup> <https://orcid.org/0009-0006-8434-862X>

Rayen Vivero Sun<sup>1</sup> <https://orcid.org/0000-0003-2419-6688>

Alicia Cillo Carrera<sup>2</sup> <https://orcid.org/0000-0003-2151-9859>

Mirian Solis Rojas<sup>3</sup> <https://orcid.org/0000-0002-9517-4315>

Verónica Delbono González<sup>4</sup> <https://orcid.org/0000-0002-9007-5668>

<sup>1</sup>Departamento de Promoción de la Salud de la Mujer y el Recién Nacido. Facultad de Medicina, Universidad de Chile. Santiago de Chile.

<sup>2</sup>Facultad de Ciencias de la Salud, Universidad Católica de la Plata. Argentina.

<sup>3</sup>Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Perú.

<sup>4</sup>Administración de los servicios de salud del Estado. Uruguay

\*Autor para la correspondencia: [lpantoja@uchile.cl](mailto:lpantoja@uchile.cl)

## RESUMEN

**Introducción:** La violencia que la pareja íntima ejerce contra la mujer durante la gestación y el postparto puede tener consecuencias a nivel físico y mental. En Latinoamérica existen escasos estudios de esta problemática.

**Objetivo:** Determinar la prevalencia de violencia de la pareja en mujeres atendidas en centros de salud primaria de cuatro países de Latinoamérica durante la gestación y el postparto y su asociación con características de la víctima.

**Métodos:** Este estudio se realizó entre los años 2017 y 2019 en Chile, Uruguay, Perú y Argentina a través de un diseño de prevalencia analítico. Para determinar la violencia contra la mujer se utilizó el instrumento "Woman Abuse Screening Tool (WAST)". Participaron 1020 mujeres en el período de gestación y 763 en el postparto. La asociación entre la violencia y las variables estudiadas en la mujer y la pareja fue determinada mediante un modelo de regresión lineal múltiple con un 95 % de confianza.

**Resultados:** La prevalencia durante la gestación fue de un 15,5 % y de un 29,6 % en el postparto. Se observó un índice similar entre Chile, Perú y Uruguay en ambos períodos estudiados. Argentina fue el país que mayor índice evidenció en ambas etapas. La presencia de violencia se asoció a mujeres inmigrantes, con el antecedente de violencia en la familia de origen y con el consumo de alcohol y drogas de la pareja.

**Conclusiones:** La violencia contra la mujer por la pareja íntima es un problema multifactorial que se observa en gran medida durante la gestación y mucho más en el periodo de postparto en países de Latinoamérica.

**Palabras clave:** violencia de pareja; gestación; período postparto; estudio multicéntrico; América Latina.

## ABSTRACT

**Introduction:** Violence against women perpetrated by intimate partners during pregnancy and postpartum can have serious physical and mental consequences for women. In Latin America there are few studies on this issue. Objective: To determine the prevalence of partner violence in women attending Primary Health Centers in four Latin American countries during pregnancy and postpartum, and its association with the victim's and partner's characteristics.

**Methods:** The study was conducted between 2017 and 2019 in Chile, Uruguay, Peru, and Argentina using an analytical prevalence design. The "Woman Abuse Screening Tool" (WAST) was used to determine the presence of violence against women. A total of 1,020 women participated during the gestation period, and 763 during the postpartum period. The association between violence and the variables studied in women and partners was determined using a multiple linear regression model with 95 % confidence.

**Results:** The overall prevalence during pregnancy was 15.5 % and 29.6 % in the postpartum period. A similar prevalence was observed between Chile, Peru and Uruguay in both periods studied, with Argentina being the country with the highest prevalence in both stages. The presence of violence was associated with immigrant women, a history of violence in the family of origin, and the partner's consumption of alcohol and drugs.

**Conclusions:** Violence against women by intimate partners is a multifactorial problem that is observed during pregnancy and postpartum in Latin America.

**Keywords:** gender violence; pregnancy; postpartum; multicenter study; Latin America

## Introducción

La violencia contra la mujer (VCM) se constituye como un problema de Salud Pública de proporciones epidémicas. Una de las formas más comunes de VCM, es la violencia de pareja, que se entiende como "cualquier comportamiento, dentro de una relación íntima, que cause o pueda causar daño físico, psíquico o sexual a los miembros de la relación".<sup>(1)</sup> Su erradicación es una prioridad en la agenda internacional y para estar en coherencia con ello la Organización de Naciones Unidas (ONU) ha propuesto a sus países miembros como meta en el objetivo de desarrollo sostenible : *"Eliminar todas las formas de violencia contra todas las mujeres y las niñas en los ámbitos público y privado, incluidas la trata y la explotación sexual y otros tipos de explotación"*.<sup>(2)</sup>

Un informe de la Organización Mundial de la Salud (OMS) estima que la prevalencia de violencia física o sexual por parte de la pareja íntima a nivel mundial es de 27 %. Esta cifra es similar a la proyectada para América Latina y el Caribe que es de un 25 %.<sup>(3)</sup> A esto se suma un informe de la ONU que señala que el confinamiento provocado por la pandemia de COVID-19 ha elevado el riesgo de violencia, y que los casos han aumentado un 30 %, <sup>(4)</sup> agravando el fenómeno y colocando a las mujeres en un estado de mayor vulnerabilidad.

El fenómeno de la violencia se puede ver agravado durante ciertos períodos del curso de vida. Es así como el embarazo y postparto se presentan como períodos sensibles. Se ha encontrado cifras variables en relación con esta problemática. Una revisión reportó amplios rangos de prevalencia, para violencia física (1,6 % a 78 %) y para violencia psicológica (1,8 % a 67,4 %).<sup>(5)</sup> Por otro lado, un metaanálisis describió que la prevalencia global para cualquier tipo de violencia de pareja durante el embarazo es de un 25 %, cifra que osciló entre un 1,8 % a un 99,5 %.<sup>(6)</sup>

Existen múltiples factores de riesgo asociados al aumento de la probabilidad de ser víctima o de perpetuar violencia en el contexto de la relación de pareja. La educación se relaciona indirectamente con otros factores.<sup>(7)</sup>

Algunos factores de la mujer que se asocian a una mayor probabilidad de ser víctima de violencia en la relación de pareja son: historia previa de violencia en el contexto de pareja,<sup>(8)</sup> matrimonio a muy temprana edad,<sup>(9)</sup> antecedente de depresión,<sup>(10)</sup> tener un menor nivel educacional,<sup>(11)</sup> estar desempleada o en condición de pobreza.<sup>(12, 13)</sup> Entre los factores de riesgo para la perpetración de la violencia se observa: un aumento de consumo de alcohol y drogas, haber estado expuesto o ser testigo de violencia durante la infancia.<sup>(14,15,16)</sup>

A pesar de que existen numerosas leyes e instrumentos de derechos humanos que, en conjunto, representan un acuerdo casi universal de que la violencia sexual y de pareja es una violación de los derechos humanos, la situación de protección de las mujeres ante este fenómeno es disímil a nivel global. Según el Banco Mundial 46 de 173 países no tienen leyes sobre violencia doméstica<sup>(17)</sup>

En cuanto a las consecuencias de la VCM, en particular la violencia de pareja, son graves y profundas ya que afectan la salud mental y física de la mujer, y se asocia con múltiples resultados adversos, como lesiones, ansiedad, depresión e ideas de suicidio.<sup>(18, 19)</sup> En el embarazo y postparto este fenómeno es especialmente preocupante, ya que los estudios señalan que las mujeres se encuentran en un estado de mayor vulnerabilidad de sufrirla en estos periodos. Entre las consecuencias de la violencia de pareja

durante el embarazo y postparto, además de las ya mencionadas, se describen más probables la depresión post parto, y para el recién nacido, un mayor riesgo de aborto espontáneo, un parto a pretérmino y/o bajo peso al nacer.<sup>(20, 21)</sup>

Las recomendaciones en general se orientan a realizar tamizaje durante la atención prenatal y en el postparto<sup>(22)</sup> para la detección de violencia de la pareja ejercida durante la gestación, ya que la detección podría mejorar los resultados de salud y disminuir las consecuencias de la violencia contra las mujeres.<sup>(23)</sup>

En América Latina existen escasos estudios de la violencia hacia la mujer durante la gestación y postparto. Por lo anterior, el objetivo de esta investigación fue determinar la prevalencia de violencia de pareja en mujeres atendidas en Centros de Salud Primaria de cuatro países de Latinoamérica (Argentina, Chile, Perú y Uruguay) durante la gestación y postparto y su asociación con características de la víctima y de la pareja.

## **Métodos**

Este estudio se realizó entre el 2017 y 2019 en Centros de Atención de Salud Primaria de los países participantes: Chile, Uruguay, Perú y Argentina, utilizando un diseño de prevalencia analítico. La prueba piloto se efectuó en Chile y sirvió de base para el desarrollo del estudio en los otros países.

Las participantes fueron mujeres atendidas en centros de atención de salud primaria que cumplieron con los criterios de inclusión: mujeres mayores de 18 años, de habla hispana, que tuvieron pareja presente durante la gestación. En cuanto al proceso de selección, las participantes fueron reclutadas en centros de atención primaria, donde se identificaron aquellas que cumplían con los criterios de inclusión, y se les invitó a participar en el estudio de manera voluntaria. La muestra final fue seleccionada a través de un muestreo por conveniencia para asegurar la representación adecuada de las mujeres atendidas en los centros de salud de cada país participante.

Para determinar la presencia de violencia contra la mujer en la gestación y postparto se aplicó el instrumento “Woman Abuse Screening Tool (WAST)”, el cual está compuesto por ocho ítems en los que se pregunta por el grado de tensión y de miedo existente en la relación de pareja y luego directamente por la existencia de episodios violentos y abusivos, tanto a nivel físico, sexual como emocional. Cada

pregunta tiene tres opciones de respuesta, que van de menor a mayor gravedad, otorgándole una puntuación de 1 a 3 puntos respectivamente. El puntaje total va de un mínimo de 8 (sin violencia) a un máximo de 24 puntos (la mayor violencia). Se consideró igual o mayor a 15 como “presencia de violencia contra la mujer”. Este instrumento fue traducido al español y validado en mujeres hispano hablantes, <sup>(24)</sup> además fue adaptado culturalmente y validado en mujeres chilenas, lo cual permitió calificarlo como una adecuada herramienta diagnóstica para este estudio. <sup>(25)</sup>

Además, se utilizó un formulario que recopiló información de las mujeres y de sus parejas. Ambos instrumentos se aplicaron previo a la pandemia durante una atención prenatal entre las 24-28 semanas de gestación y en la atención de planificación familiar a las 6 semanas postparto, por las matronas/matrones que realizaron la atención, quienes fueron previamente capacitadas/os. Las variables continuas se analizaron con promedio y desviación estándar. Las variables categóricas mediante frecuencias y proporciones. Todas las estimaciones consideraron su intervalo de confianza con un nivel 95 %. La asociación entre violencia y las variables estudiadas en la mujer y la pareja fue determinada mediante un modelo de regresión lineal múltiple, donde se consideró como variable respuesta el puntaje total del instrumento WAST y variables explicativas de la mujer: edad, escolaridad, estado civil, ocupación, ser inmigrante, número de hijos, antecedente de violencia en su familia de origen, apoyo de la pareja y apoyo de la familia; y variables explicativas de la pareja: edad, escolaridad, ocupación, consumo de alcohol y consumo de drogas, utilizando Stata 14.0.

Este estudio fue aprobado por el Comité de Ética de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile y los respectivos Comités de Ética Locales de los Centros de Salud incluidos en el estudio en cada país. Cada participante firmó un consentimiento previo donde se explicaron los objetivos de la investigación. En los casos donde se detectó violencia, las mujeres fueron derivadas al equipo de salud mental y/o social (sicólogo/a, asistente social) según protocolo local.

## **Resultados**

Se obtuvieron datos de 1020 mujeres durante la gestación y 763 mujeres en el postparto. Es importante considerar que pueden no ser las mismas mujeres, ya que este estudio no consideró un seguimiento. Las mujeres incluidas, en general, son mujeres jóvenes, que viven en pareja, dueñas de casa, que en su mayoría no planificaron su gestación. Un mayor detalle de las características de las mujeres durante la gestación y postparto se muestran en la tabla 1.

**Tabla 1** - Caracterización sociodemográfica de mujeres incluidas en el estudio, por país y total

|                                             | Gestación     |               |               |               |               | Posparto      |               |                |               |               |
|---------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|---------------|---------------|
|                                             | Argenti<br>na | Chile         | Perú          | Uru<br>guay   | Total         | Argenti<br>na | Chile         | Perú           | Uru<br>guay   | Total         |
| Total n(%)                                  | 256<br>(25,1) | 273<br>(26,7) | 293<br>(28,7) | 198<br>(19,4) | 1020<br>(100) | 259<br>(33,9) | 102<br>(13,4) | 299<br>(39,2)  | 103<br>(13,5) | 763<br>(100)  |
| Edad m(sd)                                  | 25,8<br>(5,9) | 27,1<br>(5,8) | 27,6<br>(6,1) | 25,1<br>(5,9) | 26,5<br>(6,1) | 26,2<br>(6,1) | 28,3<br>(5,9) | 27,8<br>(7,1)  | 25,9<br>(6,0) | 27,1<br>(6,4) |
| Escolaridad n(%)                            |               |               |               |               |               |               |               |                |               |               |
| Educación básica incompleta                 | 48<br>(18,8)  | 6 (2,2)       | 4 (1,3)       | 4 (2,1)       | 63 (6,2)      | 54<br>(20,9)  | 2 (1,9)       | 20 (6,6)       | 4 (3,8)       | 80<br>(10,5)  |
| Educación básica completa                   | 120<br>(46,8) | 15<br>(5,5)   | 16<br>(5,4)   | 55<br>(27,9)  | 206<br>(20,2) | 99<br>(38,2)  | 3 (2,9)       | 17 (5,6)       | 31<br>(30,1)  | 150<br>(19,6) |
| Educación media incompleta                  | 61<br>(23,8)  | 42<br>(15,5)  | 29<br>(9,9)   | 107<br>(54,3) | 240<br>(23,5) | 63<br>(24,3)  | 12<br>(11,7)  | 44<br>(14,7)   | 50<br>(48,5)  | 169<br>(22,1) |
| Educación media completa                    | 16<br>(6,2)   | 113<br>(41,7) | 137<br>(46,7) | 18<br>(9,1)   | 285<br>(27,9) | 39<br>(15,1)  | 54<br>(52,9)  | 117<br>(39,1)  | 12<br>(11,6)  | 222<br>(29,1) |
| Educación superior completa o<br>incompleta | 11<br>(4,3)   | 95<br>(35,1)  | 107<br>(36,5) | 13<br>(6,6)   | 226<br>(22,1) | 4 (1,5)       | 31<br>(30,4)  | 101<br>(33,7)  | 6 (5,8)       | 142<br>(18,6) |
| Estado civil n(%)                           |               |               |               |               |               |               |               |                |               |               |
| Casada                                      | 41<br>(16,0)  | 45<br>(16,6)  | 45<br>(15,3)  | 26<br>(13,1)  | 157<br>(15,4) | 69<br>(26,6)  | 28<br>(27,4)  | 37<br>(12,37)  | 6 (5,8)       | 140<br>(18,3) |
| Soltera                                     | 15<br>(5,8)   | 76<br>(28,1)  | 24<br>(8,1)   | 39<br>(19,7)  | 154<br>(15,1) | 14<br>(5,4)   | 17<br>(16,6)  | 36<br>(12,04)  | 29<br>(28,1)  | 96<br>(12,5)  |
| Conviviente                                 | 194<br>(75,7) | 140<br>(51,6) | 216<br>(73,7) | 123<br>(62,1) | 675<br>(66,2) | 173<br>(66,8) | 56<br>(54,9)  | 215<br>(71,91) | 65<br>(63,1)  | 509<br>(66,7) |
| Separada                                    | 5 (1,9)       | 6 (2,2)       | 8 (2,7)       | 10<br>(5,1)   | 29 (2,8)      | 3 (1,2)       | 1 (0,9)       | 10<br>(3,34)   | 2 (1,9)       | 16<br>(2,10)  |
| Divorciada                                  | 1 (0,4)       | 4 (1,5)       | 0             | 0             | 5 (0,5)       | 0             | 0             | 1<br>0,33      | 1 (0,9)       | 2 (0,3)       |

|                                                         |               |               |               |               |               |               |              |               |              |               |
|---------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------|
| Ocupación n(%)                                          |               |               |               |               |               |               |              |               |              |               |
| Dueña de casa                                           | 191<br>(74,6) | 118<br>(43,7) | 180<br>(61,4) | 138<br>(69,7) | 627<br>(61,5) | 182<br>(70,3) | 40<br>(39,2) | 209<br>(69,9) | 78<br>(75,7) | 509<br>(66,7) |
| Estudiante                                              | 16<br>(6,2)   | 23<br>(8,5)   | 16<br>(5,4)   | 13<br>(6,5)   | 68 (6,7)      | 15<br>(5,8)   | 7 (6,8)      | 24 (8,1)      | 7 (6,8)      | 53 (6,9)      |
| Trabajadora remunerada dependiente                      | 17<br>(6,6)   | 112<br>(41,5) | 42<br>(14,3)  | 37<br>(18,6)  | 210<br>(20,6) | 41<br>(15,8)  | 50<br>(49,1) | 32<br>(10,7)  | 13<br>(12,6) | 136<br>(17,8) |
| Trabajadora remunerada independiente                    | 32<br>(12,5)  | 17<br>(6,3)   | 55<br>(18,7)  | 10<br>(5,1)   | 114<br>(11,2) | 21<br>(8,1)   | 5 (4,9)      | 34<br>(11,4)  | 5 (4,8)      | 65 (8,5)      |
| Inmigrante n(%)                                         |               |               |               |               |               |               |              |               |              |               |
| No                                                      | 194<br>(75,7) | 171<br>(62,6) | 282<br>(96,5) | 171<br>(86,4) | 818<br>(80,3) | 180<br>(69,5) | 65<br>(63,7) | 287<br>(95,9) | 94<br>(91,3) | 626<br>(82,1) |
| Sí                                                      | 62<br>(24,2)  | 102<br>(37,4) | 10<br>(3,42)  | 27<br>(13,6)  | 201<br>(19,7) | 79<br>(30,5)  | 37<br>(36,3) | 12 (4,1)      | 9 (8,7)      | 137<br>(17,9) |
| Número hijos m(sd)                                      | 2,3<br>(1,6)  | 0,9<br>(1,1)  | 1,1<br>(1,2)  | 1,1<br>(1,5)  | 1,4<br>(1,4)  | 2,5<br>(1,4)  | 1,2<br>(1,1) | 1,3<br>(1,2)  | 1,5<br>(1,7) | 1,7<br>(1,5)  |
| Antecedente violencia familia n(%)                      |               |               |               |               |               |               |              |               |              |               |
| No                                                      | 142<br>(58,4) | 176<br>(64,7) | 183<br>(62,4) | 126<br>(63,6) | 627<br>(62,3) | 97<br>(54,2)  | 62<br>(60,8) | 169<br>(56,5) | 82<br>(79,6) | 410<br>(60,1) |
| Sí                                                      | 101<br>(41,6) | 96<br>(35,3)  | 110<br>(37,5) | 72<br>(36,3)  | 379<br>(37,7) | 82<br>(45,8)  | 40<br>(39,2) | 130<br>(43,5) | 21<br>(20,4) | 273<br>(39,9) |
| Embarazo Planificado n(%)                               |               |               |               |               |               |               |              |               |              |               |
| No                                                      | 191<br>(74,6) | 144<br>(52,9) | 161<br>(54,9) | 103<br>(52,1) | 599<br>(58,8) | 184<br>(71,1) | 50<br>(49,1) | 172<br>(57,5) | 55<br>(53,4) | 461<br>(60,4) |
| Sí                                                      | 65<br>(25,4)  | 128<br>(47,1) | 132<br>(45,1) | 95<br>(47,9)  | 420<br>(41,2) | 75<br>(28,9)  | 52<br>(50,9) | 127<br>(42,5) | 48<br>(46,6) | 302<br>(39,6) |
| Ingreso a control prenatal posterior de las 20 sem n(%) |               |               |               |               |               |               |              |               |              |               |
| No                                                      | 170<br>(66,4) | 218<br>(79,8) | 188<br>(64,1) | 97<br>(48,9)  | 673<br>(65,9) | 173<br>(66,8) | 78<br>(76,4) | 133<br>(44,5) | 61<br>(59,2) | 445<br>(58,3) |
| Sí                                                      | 86<br>(33,6)  | 55<br>(20,1)  | 105<br>(35,9) | 101<br>(51,1) | 347<br>(34,1) | 86<br>(33,2)  | 24<br>(23,6) | 166<br>(55,5) | 42<br>(40,8) | 318<br>(41,7) |

|                                           |               |               |               |               |               |               |              |               |              |               |
|-------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------|
| Satisfacción con apoyo de la pareja n(%)  |               |               |               |               |               |               |              |               |              |               |
| No                                        | 95<br>(37,1)  | 39<br>(14,3)  | 34<br>(11,6)  | 28<br>(14,1)  | 196<br>(19,2) | 71<br>(27,4)  | 11<br>(10,8) | 39<br>(13,1)  | 21<br>(20,4) | 142<br>(18,6) |
| Sí                                        | 161<br>(62,9) | 234<br>(85,7) | 259<br>(88,4) | 170<br>(85,9) | 824<br>(80,8) | 188<br>(72,6) | 91<br>(89,2) | 260<br>(86,9) | 82<br>(79,6) | 621<br>(81,4) |
| Satisfacción con apoyo de la familia n(%) |               |               |               |               |               |               |              |               |              |               |
| No                                        | 94<br>(36,7)  | 18<br>(6,6)   | 31<br>(10,6)  | 33<br>(16,8)  | 176<br>(17,3) | 81<br>(31,3)  | 5 (4,9)      | 27 (9,1)      | 10<br>(9,7)  | 123<br>(16,1) |
| Sí                                        | 162<br>(63,3) | 253<br>(93,4) | 262<br>(89,4) | 163<br>(83,2) | 840<br>(82,7) | 178<br>(68,7) | 97<br>(95,1) | 272<br>(90,9) | 93<br>(90,3) | 640<br>(83,9) |

Las parejas de las mujeres incluidas en el estudio también se caracterizan por ser jóvenes, tener un trabajo dependiente remunerado, tener un consumo de alcohol de 1- 4 veces al mes, la mayoría refiere no haber consumido drogas en los últimos tres meses y los que refieren haber consumido, la droga más consumida fue la marihuana (tabla 2).

**Tabla 2** - Caracterización de parejas según país y total


|                             | Gestación       |                 |                 |                 |                 | Posparto        |                 |                 |                 |                 |
|-----------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                             | Argentina       | Chile           | Perú            | Uruguay         | Total           | Argentina       | Chile           | Perú            | Uruguay         | Total           |
| Total                       | 256             | 271             | 293             | 198             | 1018            | 259             | 102             | 299             | 103             | 763             |
| Edad m(sd)                  | 28,54<br>(7,02) | 29,32<br>(6,68) | 30,95<br>(7,76) | 29,21<br>(8,87) | 29,57<br>(7,59) | 28,56<br>(7,02) | 31,20<br>(7,08) | 31,36<br>(8,27) | 29,25<br>(8,09) | 30,10<br>(7,78) |
| Escolaridad n(%)            |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| Educación básica incompleta | 74<br>(28,91)   | 9<br>(3,31)     | 1<br>(0,34)     | 14<br>(7,14)    | 98<br>(9,64)    | 62<br>(23,94)   | 4<br>(3,92)     | 30<br>(10,03)   | 14<br>13,59     | 110<br>14,42    |

|                                                           |                |                |                |                |                |                |               |               |             |              |
|-----------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|-------------|--------------|
| Educación básica completa                                 | 107<br>(41,80) | 18<br>(6,62)   | 18<br>(6,14)   | 65<br>(33,16)  | 208<br>(20,45) | 97<br>(37,45)  | 4<br>(3,92)   | 53<br>(17,73) | 29<br>28,16 | 183<br>23,98 |
| Educación media incompleta                                | 50<br>(19,53)  | 40<br>(14,71)  | 37<br>(12,63)  | 84<br>(42,86)  | 211<br>(20,75) | 57<br>(22,01)  | 15<br>(14,71) | 21<br>(7,02)  | 44<br>42,72 | 137<br>17,96 |
| Educación media completa                                  | 24<br>(9,38)   | 135<br>(49,63) | 156<br>(53,24) | 18<br>(9,18)   | 333<br>(32,74) | 41<br>(15,83)  | 50<br>(49,02) | 98<br>(32,78) | 14<br>13,59 | 203<br>26,61 |
| Educación superior completa o<br>incompleta               | 1<br>(0,39)    | 70<br>(25,74)  | 81<br>(27,65)  | 15<br>(7,65)   | 167<br>(16,42) | 2 (0,77)       | 29<br>(28,43) | 97<br>(32,44) | 2<br>1,94   | 130<br>17,04 |
| Ocupación n(%)                                            |                |                |                |                |                |                |               |               |             |              |
| Cesante (sin ocupación<br>remunerada)                     | 52<br>(20,31)  | 19<br>(6,96)   | 2<br>(0,68)    | 71<br>(35,86)  | 144<br>(14,12) | 71<br>(27,41)  | 6<br>5,88     | 9<br>3,01     | 52<br>50,49 | 138<br>18,09 |
| Estudiante                                                | 4<br>(1,56)    | 8<br>(2,93)    | 7<br>(2,39)    | 1<br>(0,51)    | 20<br>(1,96)   | 3 (1,16)       | 1<br>0,98     | 13<br>4,35    | 0           | 17<br>2,23   |
| Trabajador remunerado<br>dependiente                      | 103<br>(40,23) | 201<br>(73,63) | 166<br>(56,66) | 98<br>(49,49)  | 568<br>(55,69) | 110<br>(42,47) | 67<br>65,69   | 153<br>51,17  | 44<br>42,72 | 374<br>49,02 |
| Trabajador remunerado<br>independiente                    | 97<br>(37,89)  | 45<br>(16,48)  | 118<br>(40,27) | 28<br>(14,14)  | 288<br>(28,24) | 75<br>(28,96)  | 28<br>27,45   | 124<br>41,47  | 7<br>6,80   | 234<br>30,67 |
| Consumo de bebidas alcohólicas                            |                |                |                |                |                |                |               |               |             |              |
| Nunca                                                     | 30<br>(11,72)  | 65<br>(23,81)  | 72<br>(24,57)  | 91<br>(45,96)  | 258<br>(25,29) | 41<br>15,89    | 34<br>33,33   | 88<br>29,43   | 54<br>53,47 | 217<br>28,55 |
| 1 vez al mes o menos                                      | 44<br>(17,19)  | 119<br>(43,59) | 173<br>(59,04) | 59<br>(29,80)  | 395<br>(38,73) | 68<br>26,36    | 40<br>39,22   | 157<br>52,51  | 27<br>26,73 | 292<br>38,42 |
| 2 o 4 veces al mes                                        | 123<br>(48,05) | 75<br>(27,47)  | 41<br>(13,99)  | 35<br>(17,68)  | 274<br>(26,86) | 88<br>34,11    | 22<br>21,57   | 39<br>13,04   | 10<br>9,90  | 159<br>20,92 |
| 2 o 3 veces a la semana                                   | 46<br>(17,97)  | 12<br>(4,40)   | 7<br>(2,39)    | 8<br>(4,04)    | 73<br>(7,16)   | 49<br>18,99    | 4<br>3,92     | 10<br>3,34    | 5<br>4,95   | 68<br>8,95   |
| 4 o más veces a la semana                                 | 13<br>(5,08)   | 2<br>(0,73)    | 0              | 5<br>(2,53)    | 20<br>(1,96)   | 12<br>4,65     | 2<br>1,96     | 5<br>1,67     | 5<br>4,95   | 24<br>3,16   |
| N° tragos consumidos en un día<br>típico de consumo n (%) |                |                |                |                |                |                |               |               |             |              |
| Entre 0-2                                                 | 64<br>(25,00)  | 134<br>(54,69) | 104<br>(35,49) | 138<br>(70,05) | 440<br>(44,40) | 74<br>29,02    | 55<br>58,51   | 140<br>46,82  | 75<br>76,53 | 344<br>46,11 |

|                                         |                |                |                |                |                |              |             |              |             |              |
|-----------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|-------------|--------------|-------------|--------------|
| Entre 3-4                               | 122<br>(47,66) | 74<br>(30,20)  | 90<br>(30,72)  | 39<br>(19,80)  | 325<br>(32,80) | 106<br>41,57 | 26<br>27,66 | 85<br>28,43  | 15<br>15,31 | 232<br>31,10 |
| Entre 5-6                               | 46<br>(17,97)  | 23<br>(9,39)   | 51<br>(17,41)  | 11<br>(5,58)   | 131<br>(13,22) | 58<br>22,75  | 7<br>7,45   | 29<br>9,70   | 3<br>3,06   | 97<br>13,00  |
| Entre 7-9                               | 19<br>(7,42)   | 7<br>(2,86)    | 20<br>(6,83)   | 4<br>(2,03)    | 50<br>(5,05)   | 16<br>6,27   | 2<br>2,13   | 25<br>8,36   | 2<br>2,04   | 45<br>6,03   |
| 10 o más                                | 5<br>(1,95)    | 7<br>(2,86)    | 28<br>(9,56)   | 5<br>(2,54)    | 45<br>(4,54)   | 1<br>0,39    | 4<br>4,26   | 20<br>6,69   | 3<br>3,06   | 28<br>3,75   |
| Consumo 6 tragos o más en una ocasión   |                |                |                |                |                |              |             |              |             |              |
| Nunca                                   | 96<br>(37,50)  | 120<br>(46,51) | 91<br>(31,06)  | 120<br>(60,91) | 427<br>(42,53) | 88<br>34,11  | 53<br>56,99 | 114<br>38,13 | 69<br>70,41 | 324<br>43,32 |
| Menos de una vez al mes                 | 70<br>(27,34)  | 102<br>(39,53) | 156<br>(53,24) | 52<br>(26,40)  | 380<br>(37,85) | 93<br>36,05  | 28<br>30,11 | 135<br>45,15 | 18<br>18,37 | 274<br>36,63 |
| Mensualmente                            | 37<br>(14,45)  | 25<br>(9,69)   | 38<br>(12,97)  | 13<br>(6,60)   | 113<br>(11,25) | 23<br>8,91   | 8<br>8,60   | 36<br>12,04  | 4<br>4,08   | 71<br>9,49   |
| Semanalmente                            | 42<br>(16,41)  | 11<br>(4,26)   | 8<br>(2,73)    | 8<br>(4,06)    | 69<br>(6,87)   | 40<br>15,50  | 4<br>4,30   | 12<br>4,01   | 3<br>3,06   | 59<br>7,89   |
| Todos o casi todos los días             | 11<br>(4,30)   | 0              | 0              | 4<br>(2,03)    | 15<br>(1,49)   | 14<br>5,43   | 0           | 2<br>0,67    | 4<br>4,08   | 20<br>2,67   |
| Consumo drogas en últimos 3 meses       |                |                |                |                |                |              |             |              |             |              |
| No                                      | 198<br>(77,34) | 219<br>(80,81) | 288<br>(98,29) | 145<br>(73,60) | 850<br>(83,58) | 207<br>79,92 | 83<br>81,37 | 289<br>96,66 | 80<br>77,67 | 659<br>86,37 |
| Sí                                      | 58<br>(22,66)  | 52<br>(19,19)  | 5<br>(1,71)    | 52<br>(26,40)  | 167<br>(16,42) | 52<br>20,08  | 19<br>18,63 | 10<br>3,34   | 23<br>22,33 | 104<br>13,63 |
| Drogas consumidas                       |                |                |                |                |                |              |             |              |             |              |
| Cannabis (marihuana)                    | 34<br>(58,62)  | 52<br>(88,14)  | 3<br>(60,00)   | 42<br>(87,50)  | 131<br>(77,06) | 23<br>41,07  | 15<br>75,00 | 5<br>50,00   | 16<br>80,00 | 59<br>55,66  |
| Cocaína                                 | 24<br>(41,38)  | 2<br>(3,39)    | 2<br>(40,00)   | 2<br>(4,17)    | 30<br>(17,65)  | 26<br>46,43  | 1<br>5,00   | 4<br>40,00   | 2<br>10,00  | 33<br>31,13  |
| Anfetaminas u otro tipo de estimulantes | 0              | 5<br>(8,47)    | 0              | 0              | 5<br>(2,94)    | 1<br>1,79    | 0           | 0            | 1<br>5,00   | 2<br>1,89    |

|                                 |                |                |                |                |                |              |             |              |             |              |
|---------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|-------------|--------------|-------------|--------------|
| Otro                            | 0              | 0              | 0              | 4<br>(8,33)    | 4<br>(2,35)    | 6<br>10,71   | 4<br>20,00  | 1<br>10,00   | 1<br>5,00   | 12<br>11,32  |
| Frecuencia de consumo de drogas |                |                |                |                |                |              |             |              |             |              |
| Nunca                           | 198<br>(77,34) | 178<br>(78,07) | 284<br>(97,59) | 151<br>(77,44) | 811<br>(83,61) | 207<br>79,92 | 44<br>72,13 | 289<br>96,66 | 76<br>79,17 | 616<br>86,15 |
| 1 o 2 veces                     | 1<br>(0,39)    | 16<br>(7,02)   | 5<br>(1,72)    | 12<br>(6,15)   | 34<br>(3,51)   | 9<br>3,47    | 7<br>11,48  | 5<br>1,67    | 7<br>7,29   | 28<br>3,92   |
| Cada mes                        | 0 (0)          | 10<br>(4,39)   | 1<br>(0,34)    | 1<br>(0,51)    | 12<br>(1,24)   | 4<br>1,54    | 1<br>1,64   | 3<br>1,00    | 3<br>3,12   | 11<br>1,54   |
| Cada semana                     | 31<br>(12,11)  | 10<br>(4,39)   | 1<br>(0,34)    | 11<br>(5,64)   | 53<br>(5,46)   | 22<br>8,49   | 4<br>6,56   | 2<br>0,67    | 1<br>1,04   | 29<br>4,06   |
| A diario o casi a diario        | 26<br>(10,16)  | 14<br>(6,14)   | 0              | 20<br>(10,26)  | 60<br>(6,19)   | 17<br>6,56   | 5<br>8,20   | 0            | 9<br>9,38   | 31<br>4,34   |

En relación con la presencia de violencia se observó una prevalencia durante la gestación de un 15.5 % y de un 29.6 % en el postparto. Se observó una prevalencia similar entre Chile, Perú y Uruguay en ambos períodos estudiados, siendo Argentina el país que mayor predominio evidenció en ambas etapas (fig. 1).



**Fig. 1** – Prevalencia de violencia por país, en el período de gestación y postparto

Al analizar con detalle el instrumento WAST, se observó que durante la gestación y el postparto alrededor de la mitad de las mujeres describieron tener una relación de pareja con presencia de estrés, además cuando resuelven sus discusiones lo hacen con dificultad y que muchas veces o a veces posterior a las discusiones se sienten decaídas o mal con ellas mismas.

Existe un grupo menor de mujeres que evidencian en sus respuestas la gravedad del fenómeno tanto en la gestación como en el postparto: entre el 15 y 18 % declararon que las discusiones terminan en golpes, patadas o empujones; entre un 26,8 y 36 % mencionaron que han sentido miedo de las reacciones de su pareja; entre un 17,2 y un 23,9 % manifestaron que su pareja le controla el dinero que gasta o la obliga a realizar trabajo en exceso; entre un 26,9 y un 33,2 % sus parejas las insultan, garabatean, gritan humillan y descalifican verbalmente; y entre un 17,7 y un 25,8 % se han sentido obligadas a tener relaciones sexuales con sus parejas para evitar problemas. (tabla 3)

**. Tabla 3** - Puntajes del WAST por pregunta, según por país y total

[illegible]

|                                                                                  |              |              |              |              |              |              |             |              |             |              |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------|--------------|-------------|--------------|
| ¿usted se siente decaída o mal con usted misma?                                  |              |              |              |              |              |              |             |              |             |              |
| Muchas veces                                                                     | 48<br>18,75  | 20<br>7,35   | 19<br>6,48   | 8<br>4,04    | 95<br>9,32   | 33<br>12,74  | 9<br>8,82   | 25<br>8,36   | 5<br>4,85   | 72<br>9,44   |
| A veces                                                                          | 115<br>44,92 | 144<br>52,94 | 158<br>53,92 | 65<br>32,83  | 482<br>47,30 | 117<br>45,17 | 49<br>48,04 | 181<br>60,54 | 44<br>42,72 | 391<br>51,25 |
| Nunca                                                                            | 93<br>36,33  | 108<br>39,71 | 116<br>39,59 | 125<br>63,13 | 442<br>43,38 | 109<br>42,08 | 44<br>43,14 | 93<br>31,10  | 54<br>52,43 | 300<br>39,32 |
| 4. Las discusiones terminan en golpes, patadas o empujones                       |              |              |              |              |              |              |             |              |             |              |
| Muchas veces                                                                     | 25<br>9,77   | 0            | 2<br>0,68    | 1<br>0,51    | 28<br>2,75   | 30<br>11,58  | 1<br>0,98   | 1<br>0,33    | 5<br>4,85   | 37<br>4,85   |
| A veces                                                                          | 84<br>32,81  | 10<br>3,68   | 28<br>9,56   | 11<br>5,56   | 133<br>13,05 | 81<br>31,27  | 3<br>2,94   | 23<br>7,69   | 1<br>0,97   | 108<br>14,15 |
| Nunca                                                                            | 147<br>57,42 | 262<br>96,32 | 263<br>89,76 | 186<br>93,94 | 858<br>84,20 | 148<br>57,14 | 98<br>96,08 | 275<br>91,97 | 97<br>94,17 | 618<br>81,00 |
| 5. Hay situaciones en las cuales ha sentido miedo de las reacciones de su pareja |              |              |              |              |              |              |             |              |             |              |
| Muchas veces                                                                     | 33<br>12,89  | 4<br>1,47    | 11<br>3,75   | 3<br>1,52    | 51<br>5,00   | 32<br>12,36  | 1<br>0,98   | 14<br>4,68   | 2<br>1,94   | 49<br>6,42   |
| A veces                                                                          | 87<br>33,98  | 39<br>14,34  | 79<br>26,96  | 18<br>9,09   | 223<br>21,88 | 100<br>38,61 | 19<br>18,63 | 96<br>32,11  | 11<br>10,68 | 226<br>29,62 |

[illegible]

|                   |              |              |              |              |              |              |             |              |             |              |
|-------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------|--------------|-------------|--------------|
| evitar problemas? |              |              |              |              |              |              |             |              |             |              |
| Muchas veces      | 37<br>14,45  | 1<br>0,37    | 3<br>1,02    | 2<br>1,01    | 43<br>4,22   | 43<br>16,60  | 1<br>0,98   | 7<br>2,34    | 0           | 51<br>6,68   |
| A veces           | 104<br>40,62 | 13<br>4,78   | 20<br>6,83   | 1<br>0,51    | 138<br>13,54 | 122<br>47,10 | 2<br>1,96   | 18<br>6,02   | 4<br>3,88   | 146<br>19,13 |
| Nunca             | 115<br>44,92 | 258<br>94,85 | 270<br>92,15 | 195<br>98,48 | 838<br>82,24 | 94<br>36,29  | 99<br>97,06 | 274<br>91,64 | 99<br>96,12 | 566<br>74,18 |

En relación con el análisis multivariado, durante la gestación, las variables más importantes que disminuyen el total del puntaje WAST y por lo tanto la existencia de violencia, son el apoyo de la pareja y el apoyo de la familia, mientras que las que aumentan el puntaje son ser inmigrante, el número de hijos, el antecedente de violencia de la familia de origen y el consumo de alcohol y drogas de la pareja. Asimismo, durante el postparto, las variables más importantes que disminuyen el puntaje total del instrumento son la escolaridad, el apoyo de la familia y la pareja. Las variables que aumentan el puntaje son ser inmigrante, el antecedente de violencia de la familia de origen y el consumo de alcohol y drogas de la pareja (tabla 4).

. **Tabla 4** - Modelo Multivariado: Presencia de violencia durante la gestación y el postparto

|                             | Embarazadas        |         |                    |               | Postparto     |         |            |               |
|-----------------------------|--------------------|---------|--------------------|---------------|---------------|---------|------------|---------------|
| Variable                    | coef               | P value | [95% Conf.         | Interval]     | coef          | P value | [95% Conf. | Interval]     |
|                             |                    |         |                    |               |               |         |            |               |
| <b>Edad mujer</b>           | -<br>0,038646<br>5 | 0,074   | -<br>0,081093<br>6 | 0,003800<br>5 | 0,007814<br>2 | 0,758   | -0,04194   | 0,057568<br>4 |
|                             |                    |         |                    |               |               |         |            |               |
| <b>Escolaridad</b>          |                    |         |                    |               |               |         |            |               |
| Educación básica incompleta | Ref                |         |                    |               | Ref           |         |            |               |

|                                          |                    |              |                    |                    |                    |              |                    |                    |
|------------------------------------------|--------------------|--------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------|--------------------|--------------------|
| Educación básica completa                | -<br>0,889830<br>1 | <b>0,029</b> | -<br>1,689932      | -<br>0,089728<br>7 | -<br>2,258162      | <b>0,000</b> | -<br>3,147605      | -<br>1,368718      |
| Educación media incompleta               | -<br>0,631745<br>8 | 0,128        | -<br>1,446015      | 0,182523           | -<br>1,997377      | <b>0,000</b> | -<br>2,859736      | -<br>1,135019      |
| Educación media completa                 | -<br>0,727901<br>2 | 0,099        | -<br>1,593965      | 0,138162<br>4      | -<br>2,981894      | <b>0,000</b> | -3,85872           | -<br>2,105067      |
| Educación superior completa o incompleta | -<br>0,612050<br>4 | 0,192        | -1,53171           | 0,307609           | -<br>2,976218      | <b>0,000</b> | -<br>3,973665      | -1,97877           |
|                                          |                    |              |                    |                    |                    |              |                    |                    |
| <b>Estado civil</b>                      |                    |              |                    |                    |                    |              |                    |                    |
| Casada                                   | Ref                |              |                    |                    | Ref                |              |                    |                    |
| Soltera                                  | -<br>0,735419<br>2 | <b>0,025</b> | -<br>1,378902      | -<br>0,091936<br>7 | -<br>0,152495<br>3 | 0,702        | -<br>0,933800<br>3 | 0,628809<br>7      |
| Conviviente                              | -<br>0,901810<br>3 | <b>0,000</b> | -<br>1,383297      | -<br>0,420323<br>5 | -<br>0,133122<br>1 | 0,613        | -<br>0,650315<br>6 | 0,384071<br>3      |
| Separada                                 | 0,022300<br>2      | 0,968        | -<br>1,076573      | 1,121174           | 1,708632           | <b>0,020</b> | 0,272456<br>9      | 3,144807           |
| Divorciada                               | -<br>1,799953      | 0,139        | -<br>4,183403      | 0,583498<br>1      | 0,197678<br>9      | 0,918        | -<br>3,550761      | 3,946119           |
|                                          |                    |              |                    |                    |                    |              |                    |                    |
| <b>Ocupación</b>                         |                    |              |                    |                    |                    |              |                    |                    |
| Dueña de casa                            | Ref                |              |                    |                    | Ref                |              |                    |                    |
| Estudiante                               | 0,098702           | 0,783        | -<br>0,606018<br>3 | 0,803422<br>3      | -<br>0,126493<br>7 | 0,755        | -<br>0,921495      | 0,668507<br>6      |
| Trabajadora remunerada dependiente       | -<br>0,086878<br>5 | 0,704        | -<br>0,534988<br>5 | 0,361231<br>4      | -<br>0,690894<br>1 | <b>0,021</b> | -<br>1,275243      | -<br>0,106544<br>7 |

|                                      |                    |       |                    |                    |                    |       |                    |               |
|--------------------------------------|--------------------|-------|--------------------|--------------------|--------------------|-------|--------------------|---------------|
| Trabajadora remunerada independiente | 0,085404<br>7      | 0,760 | -<br>0,463101<br>4 | 0,633910<br>8      | 0,173291<br>4      | 0,637 | -<br>0,546909<br>7 | 0,893492<br>5 |
|                                      |                    |       |                    |                    |                    |       |                    |               |
| Inmigrante                           | 0,532252<br>8      | 0,017 | 0,096093<br>7      | 0,968411<br>8      | 0,865095           | 0,002 | 0,329006<br>7      | 1,401183      |
| Número hijos                         | 0,287035<br>4      | 0,000 | 0,130805<br>1      | 0,443265<br>8      | 0,097766<br>4      | 0,291 | -<br>0,083913<br>1 | 0,279445<br>9 |
| Antecedente violencia familia        | 0,682077<br>6      | 0,000 | 0,400943<br>6      | 0,963211<br>6      | 0,635463           | 0,003 | 0,221974<br>7      | 1,048951      |
| Apoyo pareja                         | -<br>3,045927      | 0,000 | -<br>3,535063      | -<br>2,556792      | -<br>2,232924      | 0,000 | -<br>2,816372      | -<br>1,649476 |
| Apoyo familia                        | -<br>1,297886      | 0,000 | -<br>1,799699      | -<br>0,796073<br>4 | -<br>1,657527      | 0,000 | -<br>2,275573      | -<br>1,039481 |
| Edad pareja                          | -<br>0,009144<br>4 | 0,557 | -<br>0,039706<br>9 | 0,021418<br>1      | -<br>0,005760<br>4 | 0,768 | -<br>0,044136      | 0,032615<br>3 |
|                                      |                    |       |                    |                    |                    |       |                    |               |
| Escolaridad Pareja                   |                    |       |                    |                    |                    |       |                    |               |
| Educación básica incompleta          | Ref                |       |                    |                    | Ref                |       |                    |               |
| Educación básica completa            | -<br>0,277861<br>3 | 0,431 | -<br>0,969909<br>3 | 0,414186<br>7      | 0,215688<br>3      | 0,562 | -<br>0,514917<br>3 | 0,946293<br>9 |
| Educación media incompleta           | -<br>0,180012      | 0,624 | -<br>0,901384<br>8 | 0,541360<br>9      | 0,200423           | 0,595 | -<br>0,540492<br>3 | 0,941338<br>3 |
| Educación media completa             | -<br>0,154131<br>7 | 0,691 | -<br>0,915801<br>1 | 0,607537<br>7      | -<br>0,273893<br>3 | 0,469 | -<br>1,015787      | 0,468000<br>7 |
| Educación superior completa o inco.. | -<br>0,650397<br>1 | 0,141 | -<br>1,515815      | 0,215020<br>4      | -<br>0,394624<br>1 | 0,374 | -<br>1,265134      | 0,475885<br>8 |
|                                      |                    |       |                    |                    |                    |       |                    |               |

| Ocupación Pareja                    |               |              |                    |               |               |              |               |          |
|-------------------------------------|---------------|--------------|--------------------|---------------|---------------|--------------|---------------|----------|
| Cesante (sin ocupación remunerada)  | Ref           |              |                    |               | Ref           |              |               |          |
| Estudiante                          | 0,789281<br>3 | 0,237        | -<br>0,519697<br>4 | 2,09826       | 1,576054      | <b>0,035</b> | 0,109950<br>4 | 3,042157 |
| Trabajador remunerado dependiente   | 0,230977<br>8 | 0,408        | -<br>0,317166<br>5 | 0,779122<br>1 | 0,683879<br>1 | <b>0,035</b> | 0,049942<br>1 | 1,317816 |
| Trabajador remunerado independiente | 0,369184<br>8 | 0,209        | -<br>0,207388<br>6 | 0,945758<br>1 | 0,916131<br>6 | <b>0,008</b> | 0,244541<br>1 | 1,587722 |
|                                     |               |              |                    |               |               |              |               |          |
| Consumo alcohol pareja              | 1,070567      | <b>0,000</b> | 0,879058<br>4      | 1,262075      | 0,968247<br>2 | <b>0,000</b> | 0,748465<br>9 | 1,188029 |
| Consumo drogas pareja               | 0,833595<br>6 | <b>0,001</b> | 0,336313<br>5      | 1,330878      | 1,355272      | <b>0,000</b> | 0,717631<br>8 | 1,992911 |

## Discusión

La violencia contra la mujer por la pareja íntima es un problema de salud pública a nivel mundial, donde Latinoamérica no es una excepción. Los reportes de prevalencia existentes son variados según el país y el instrumento utilizado. En una revisión sistemática se informó una presencia de violencia durante la gestación por parte de la pareja de 1,4 % en Japón, 6,4 % en USA, 13,9 % en India, 18 % en Guatemala, 19,2 % en Brasil, 31,2 % en España, 35,4 % en Vietnam, 44,1 % en Egipto, 73 % en Irán.<sup>(5)</sup> En este estudio, se observó un total de un 15,5 % en las gestantes, con diferencias que oscilaron entre un 3,5 % en Uruguay a un 42,6 % en Argentina, a pesar de que se utilizó el mismo instrumento en cada país. Lo anterior, se puede deber a factores culturales y sociales,<sup>(26)</sup> los cuales podrían contribuir a la mayor violencia contra las mujeres en Argentina. Sin embargo, se necesitan más estudios para comprender por qué las mujeres argentinas perciben más violencia por parte de sus parejas, en comparación de las mujeres de los otros países de Latinoamérica incluidos en este estudio.

Según los resultados de este estudio, las mujeres que han experimentado actos violentos durante la infancia en su familia de origen tienen una mayor probabilidad de sufrir violencia por su pareja durante la gestación y el postparto.<sup>(27)</sup> Lo anterior se respalda bajo la lógica del ciclo intergeneracional de la violencia, que fundamenta que el haber estado expuesto durante la niñez aumenta la probabilidad de perpetuarla o sufrirla en la vida adulta.<sup>(28)</sup> Además, las mujeres que han sido víctimas de estos eventos antes de la gestación, evidencian un impacto negativo en su salud mental, lo cual podría provocar una menor capacidad de manejo del estrés y mayor presencia de síntomas depresivos,<sup>(29)</sup> así como también presentar baja autoestima, lo cual podría llevarlas a tener relaciones abusivas, exponiendo a las mujeres a una situación de vulnerabilidad y a la vez ser víctimas de violencia por parte de su pareja.<sup>(27)</sup>

Las mujeres inmigrantes durante la gestación pueden experimentar violencia de la pareja debido al aislamiento social y a problemas económicos, que no son exclusivos de las mujeres migrantes, pero pueden ser más frecuentes cuando se encuentran en esta condición. La probabilidad puede ser de 3,5 veces más, según lo reportado por otros autores. Los resultados de este estudio corroboran dicha aseveración, ya que se encontraron diferencias significativas en cuanto al estatus de inmigrante.<sup>(30)</sup> Las mujeres inmigrantes, generalmente son dependientes de manera económica y legal de sus parejas, además la incertidumbre que pueden tener como familia genera un estrés entre la pareja que aumenta el riesgo de violencia.<sup>(31)</sup> Lo anterior, dependerá del tipo de relación que tenía la pareja antes de migrar, por lo que en relaciones muy jerarquizadas donde existe un bajo poder de negociación por parte de las mujeres, el riesgo de ser violentadas aumenta.<sup>(32)</sup> En este contexto, en algunas ocasiones las mujeres inmigrantes subutilizan los servicios sanitarios disponibles, debido principalmente al desconocimiento del funcionamiento del sistema de salud y la barrera idiomática, que dificulta la comunicación con profesionales de la salud, o el miedo de ser deportadas en caso de estar en una situación migratoria irregular.<sup>(33)</sup> Todos estos factores obstaculizan el acceso a una detección e intervención temprana, por lo que es vital que todas las mujeres puedan acceder a los recursos de apoyo, independiente de su estatus migratorio.<sup>(34)</sup>

Con respecto a las características de la pareja, en este estudio se observó, que las mujeres tienen más probabilidad de sufrir violencia durante la gestación y el postparto cuando la pareja consume alcohol o drogas, asociación reportada ampliamente.<sup>(35, 36)</sup> Un estudio estimó que este riesgo puede ser el doble, en comparación con aquellas mujeres cuyas parejas no bebían alcohol (ORA = 2,12; IC 95 %: 1,4-3,2), independientemente de su estatus sociodemográfico.<sup>(37)</sup> Otro estudio respalda el consumo de drogas

por parte de la pareja como factor de riesgo de violencia durante la gestación (OR = 1,8; IC 95 % = 1,4 – 2,2).<sup>(38)</sup>

La consideración previa demanda un análisis de estas variables desde una perspectiva interseccional.<sup>(39)</sup> Al reconocer que la VCM está agravada y resulta más difícil de contener debido a una amalgama de determinantes vinculados con la pobreza, la marginalidad, la dependencia económica, la migración, entre otros factores, logramos comprender y abordar de manera más completa la complejidad de este fenómeno. Aunque la VCM es transversal, afecta de manera diferenciada a las mujeres, tornando a algunas de ellas significativamente más vulnerables.<sup>(40)</sup>

El rol de los y las profesionales de la salud que se encuentran cercanos a la mujer durante la gestación y el postparto como lo es la matrona y matró, un profesional que acompaña a la mujer durante todo su ciclo vital, es fundamental para detectar antecedentes de abuso previo que permitan generar acciones más precoces. Sin embargo, no solo es importante consultar durante la entrevista, sino que también se debe ofrecer la ayuda que la mujer necesita para evitar el severo impacto que puede provocar la violencia durante la gestación y postparto en la mujer y su hijo/a.<sup>(41)</sup> Considerando la compleja naturaleza y multifactorialidad, y las bases estructurales de la violencia en contra de la mujer, es necesario contar con un equipo interdisciplinar para abordar la problemática de forma integral. Para lo anterior, es primordial que profesionales de la salud reciban educación continua para la detección y manejo de la violencia contra la mujer durante este período tan crucial, lo que garantizará que se encuentren actualizados y actualizadas en las mejores prácticas en esta problemática y así poder ofrecer una orientación adecuada.<sup>(42)</sup>

Una de las limitaciones de este estudio fue que se trabajó con muestras diferentes, es decir, las gestantes incluidas en el estudio no necesariamente fueron las mismas en el postparto, por lo tanto, no existió un seguimiento de las mujeres y no se pudo realizar un análisis de la evolución del fenómeno, sino que fueron analizados como grupos independientes. Aun cuando ambos períodos están relacionados intrínsecamente, la naturaleza de ambos presenta desafíos diferentes, mientras el riesgo potencial de las gestantes está relacionado al bienestar materno y fetal, durante el postparto se enfrentan a factores asociados con la recuperación del parto y la crianza de hijos/as. Otra limitación que se presentó durante la búsqueda de la literatura, es que no existe consenso para la medición de violencia contra la mujer, por lo que los resultados de otros autores presentados pueden haberse estimado con instrumentos diferentes al utilizado en esta investigación.

## **Conclusiones**

En este estudio hay diferencia de la prevalencia de la VCM durante la gestación y postparto entre los países incluidos. La presencia de violencia durante la gestación y postparto se asoció a ser inmigrante, al número de hijos, a tener antecedente de violencia en la familia de origen, al consumo de alcohol y drogas por parte de la pareja. Por otro lado, se observó cómo variables que disminuyen la presencia de violencia en ambos períodos, el apoyo de la familia y su pareja. Estas estimaciones fueron realizadas pre pandemia siguen evidenciando que es un problema importante de salud pública en Latinoamérica, el cual sabemos se agudizó durante la pandemia, planteándonos el desafío de mirar fenómeno desde la actualidad.

## **Agradecimientos**

Agradecemos la colaboración voluntaria y generosa de todas las mujeres participantes. También a las y los profesionales de la salud que facilitaron la realización de este estudio. Agradecemos la valoración esta temática por parte de la Confederación Internacional de Matronas (ICM) que gentilmente financió este estudio.

## **Referencias bibliográficas**

1. (OMS) Organización Mundial de la Salud. Violencia contra la Mujer 2021 [acceso26/03/2025]. Disponible en: <https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/violence-against-women>.
2. Naciones Unidas. Objetivo 5: Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y las niñas 2023 [acceso:26/03/2025]. Disponible en: <https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/gender-equality/>
3. (OMS) Organización Mundial de la Salud. Violencia contra las mujeres, estimaciones para 2018: estimaciones mundiales, regionales y nacionales de la prevalencia de la violencia de pareja contra las mujeres y estimaciones mundiales y regionales de la prevalencia de la violencia sexual fuera de la pareja

contra las mujeres. 2018. [acceso 23/11/2023]. Disponible en: <https://www.who.int/publications/i/item/9789240022256>

4. Naciones Unidas. Informe de los objetivos de desarrollo sostenible 2020. ONU; 2020[acceso 27/11/2023]. Disponible en: [https://unstats.un.org/sdgs/report/2020/The-Sustainable-Development-Goals-Report-2020\\_Spanish.pdf](https://unstats.un.org/sdgs/report/2020/The-Sustainable-Development-Goals-Report-2020_Spanish.pdf)

5. Román-Gálvez RM, Martín-Peláez S, Martínez-Galiano JM, Khan KS, Bueno-Cavanillas A. Prevalence of intimate partner violence in pregnancy: an umbrella review. *International journal of environmental research and public health*. 2021;18(2):707. DOI: <https://doi.org/10.3390/ijerph18020707>

6. Román-Gálvez RM, Martín-Peláez S, Fernández-Félix BM, Zamora J, Khan KS, Bueno-Cavanillas A. Worldwide prevalence of intimate partner violence in pregnancy. A systematic review and meta-analysis. *Frontiers in public health*. 2021;1278. DOI: <https://doi.org/10.3389/fpubh.2021.738459>

7. Gunarathne L, Bhowmik J, Apputhurai P, Nedeljkovic M. Factors and consequences associated with intimate partner violence against women in low- and middle-income countries: A systematic review. *PLoS One*. 2023;18(11):e0293295. DOI: <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0293295>

8. Mazza M, Marano G, del Castillo AG, Chieffo D, Monti L, Janiri D, Moccia L, Sani G. Intimate partner violence: A loop of abuse, depression and victimization. *World J Psychiatr* 2021; 11(6): 215-221 [PMID: [34168968](https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34168968/) DOI: <https://doi.org/10.5498/wjp.v11.i6.215>]

9. Coll, C.V.N.; Wendt, A.; Santos, T.M.; Bhatia, A.; Barros, A.J.D. Cross-National Associations between Age at Marriage and Intimate Partner Violence among Young Women: An Analysis of Demographic and Health Surveys from 48 Countries. *Int. J. Environ. Res. Public Health* 2023, 20, 3218. DOI: <https://doi.org/10.3390/ijerph20043218>

10. Oram, S., Fisher, H. L., Minnis, H., Seedat, S., Walby, S., Hegarty, K., ... & Howard, L. M. The Lancet Psychiatry Commission on intimate partner violence and mental health: advancing mental health services, research, and policy. *The Lancet Psychiatry*. 2022; 9(6):487-524. DOI: [https://doi.org/10.1016/S2215-0366\(22\)00008-6](https://doi.org/10.1016/S2215-0366(22)00008-6)

11. Tjaden PG. Full report of the prevalence, incidence, and consequences of violence against women: Findings from the National Violence Against Women Survey: US Department of Justice, Office of Justice

Programs, National Institute of ...; 2000. [acceso 30/11/2023]. Disponible en: <https://www.ojp.gov/pdffiles1/nij/183781.pdf>

12. Yuan, W., & Hesketh, T. Intimate Partner Violence and Depression in Women in China. *Journal of Interpersonal Violence*. 2019; 36(21-22), NP12016-NP12040. DOI: <https://doi.org/10.1177/0886260519888538>

13. (OMS) Organización Mundial de la Salud. Violence against women: intimate partner and sexual violence against women: evidence brief. World Health Organization; 2019. [acceso 27/11/2023]. Disponible en: <https://www.who.int/publications/i/item/WHO-RHR-19.16>

14. Christina M. Dardis, Sarah E. Ullman, Lindsey M. Rodriguez, Emily A. Waterman, Emily R. Dworkin, Katie M. Edwards. Bidirectional associations between alcohol use and intimate partner violence and sexual assault victimization among college women. *Addictive Behaviors*. 2021; Volume 116,2021,106833, ISSN 0306-4603. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.addbeh.2021.106833>

15. Camille A. Clare, Gabriela Velásquez, Gabriela M. Mujica Martorell, David Fernández, Jacqueline Dinh, Angela Montague. Risk factors for male perpetration of intimate partner violence: A review. *Aggression and Violent Behavior*. 2021; Volume 56, 101532, ISSN 1359-1789. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.avb.2020.101532>

16. Stark L, Seff I, Reis C. Gender-based violence against adolescent girls in humanitarian settings: a review of the evidence. *The Lancet Child & Adolescent Health*. 2021;5(3):210-22. DOI: [https://doi.org/10.1016/S2352-4642\(20\)30245-5](https://doi.org/10.1016/S2352-4642(20)30245-5)

17. World Bank. Women, business and the law 2016: Getting to equal: The World Bank; 2015. [acceso 20/10/2023]. Disponible en: <https://thedocs.worldbank.org/en/doc/810421519921949813-0050022015/original/WomenBusinessandtheLaw2016.pdf>

18. Stubbs A, Szoek C. The effect of intimate partner violence on the physical health and health-related behaviors of women: A systematic review of the literature. *Trauma, violence, & abuse*. 2022;23(4):1157-72. DOI: <https://doi.org/10.1177/1524838020985541>

19. Cirici Amell R, Soler AR, Cobo J, Soldevilla Alberti JM. Psychological consequences and daily life adjustment for victims of intimate partner violence. *The International Journal of Psychiatry in Medicine*. 2023;58(1):6-19. DOI: <https://doi.org/10.1177/00912174211050504>

20. Da Thi Tran T, Murray L, Van Vo T. Intimate partner violence during pregnancy and maternal and child health outcomes: a scoping review of the literature from low-and-middle income countries from 2016-2021. BMC pregnancy and childbirth. 2022;22(1):1-13. DOI: <https://doi.org/10.1186/s12884-022-05117-9>
21. Khatoon, F., Fatima, M., Zaidi, Z. et al. Domestic Violence During Pregnancy: Evaluating the Impact on Maternal and Perinatal Health—A Pilot Study in Uttar Pradesh. J Obstet Gynecol India. 2021; 71, 386–92. DOI: <https://doi.org/10.1007/s13224-021-01463-4>
22. The American College of Obstetricians and Gynecologists. ACOG committee opinion no. 518: intimate partner violence. Obstet Gynecol. 2012;119(2 Pt 1):412-7. DOI: <https://doi.org/10.1097/AOG.0b013e318249ff74>
23. Miller CJ, Adjognon OL, Brady JE, Dichter ME, Iverson KM. Screening for intimate partner violence in healthcare settings: An implementation-oriented systematic review. Implementation research and practice. 2021;2:26334895211039894. DOI: <https://doi.org/10.1177/26334895211039894>
24. Fogarty CT, Brown JB. Screening for abuse in Spanish-speaking women. The Journal of the American Board of Family Practice. 2002;15(2):101-11. [acceso 27/11/2023]. Disponible en: <https://www.jabfm.org/content/15/2/101>
25. Binfa L, Cancino V, Ugarte I, Mella M, Cavada G. Adaptación del instrumento WAST para la detección de violencia doméstica en Centros de Salud. Revista médica de Chile. 2018;146(3):331-40. DOI: <https://dx.doi.org/10.4067/s0034-98872018000300331>
26. Johnson J, Haider F, Ellis K, Hay D, Lindow S. The prevalence of domestic violence in pregnant women. BJOG: an international journal of obstetrics and gynecology. 2003;110(3):272-5. DOI: <https://doi.org/10.1046/j.1471-0528.2003.02216.x>
27. Bhatta N, Assanangkornchai S. Patterns of domestic violence against women during pregnancy and the postpartum period in Kathmandu, Nepal. Asia-Pacific Psychiatry. 2019;11(1):e12342. DOI: <https://doi.org/10.1111/appy.12342>
28. Díaz LJ. Repercusiones infantiles de la violencia familiar/doméstica. Familia Revista de Ciencia y Orientación familiar. 2020(58):99-115. DOI: <https://doi.org/10.36576/summa.131285>

29. Goldstein BL, Briggs-Gowan MJ, Grasso DJ. The effects of intimate partner violence and a history of childhood abuse on mental health and stress during pregnancy. *Journal of family violence*. 2021;36:337-46. DOI: <https://doi.org/10.1007/s10896-020-00149-1>
30. Antoniou E, Iatrakis G. Domestic violence during pregnancy in Greece. *International journal of environmental research and public health*. 2019;16(21):4222. DOI: <https://doi.org/10.3390/ijerph16214222>
31. Cardona Ospina M, Grisales Velásquez M, Chiquillo Monroy A, Martínez Cossio LM, Escudero Zapata V, Pertuz Ricardo Y. Experiencias de violencia de género en mujeres migrantes venezolanas en Medellín, Colombia. 2022. [acceso 27/11/2023]. Disponible en: <https://dspace.tdea.edu.co/handle/tdea/2577>
32. Yañez Vallejos Y., Reyes Chacana H. Violencia contra las mujeres migrantes haitianas en contexto de pareja: análisis a partir de la voz de las víctimas: Universidad Academia de Humanismo Cristiano; 2020.[acceso 10/11/2023]. Disponible en: <https://bibliotecadigital.academia.cl/xmlui/handle/123456789/6729>
33. Cuesta-García, A., y Crespo, M. Barreras en la búsqueda de ayuda para mujeres inmigrantes sobrevivientes de violencia de pareja: Una revisión sistemática. *Journal of Victimology*. 2022; 14, 33-59. DOI: <https://doi.org/10.12827/RVJV.14.01>
34. Romero M. Experiencias de violencia de género en mujeres migrantes bolivianas residentes en Tarapacá, Chile. *Estudios fronterizos*. 2022;23. DOI: <https://doi.org/10.21670/ref.2201085>
35. Wagman JA, Donta B, Ritter J, Naik D, Nair S, Saggurti N, et al. Husband's alcohol use, intimate partner violence, and family maltreatment of low-income postpartum women in Mumbai, India. *Journal of interpersonal violence*. 2018;33(14):2241-67. DOI: <https://doi.org/10.1177/0886260515624235>
36. Gebrezgi BH, Badi MB, Cherkose EA, Weldehaweria NB. Factors associated with intimate partner physical violence among women attending antenatal care in Shire Endaselassie town, Tigray, northern Ethiopia: a cross-sectional study, July 2015. *Reproductive health*. 2017;14:1-10. DOI <https://doi.org/10.1186/s12978-017-0337-y>
37. Bhatta N, Assanangkornchai S, Rajbhandari I. Does husband's alcohol consumption increase the risk of domestic violence during the pregnancy and postpartum periods in Nepalese women? *BMC public*

health.

2021;21:1-9.

DOI: <https://doi.org/10.1186/s12889-020-10021-y>

38. Charles P, Perreira KM. Intimate partner violence during pregnancy and 1-year post-partum. Journal of family violence. 2007;22:609-19. DOI: <https://doi.org/10.1007/s10896-007-9112-0>

39. Moreno MJ, Raesfeld LJ, González RED. Diagnóstico interseccional de violencia hacia mujeres indígenas. Revista Estudios Feministas. 2021;29:e63207. DOI: <https://doi.org/10.1590/1806-9584-2021v29n163207>

40. Finnbogadottir H, Mellgren C. The degree of suffering among pregnant women with a history of violence, help-seeking, and police reporting. Sexual & Reproductive Healthcare. 2017;13:23-8. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.srhc.2017.05.003>

41. Provençal N, Binder EB. The effects of early life stress on the epigenome: from the womb to adulthood and even before. Experimental neurology. 2015;268:10-20. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.expneurol.2014.09.001>

42. Villamil MML, Romero MLR. Perspectiva de profesionales de salud sobre la violencia de la pareja en el embarazo. Investigación en Enfermería: Imagen y Desarrollo. 2019;21(2). DOI: <https://doi.org/10.11144/Javeriana.ie21-2.ppsv>

### **Conflicto de intereses**

Los autores declaran que no tienen conflicto de intereses.

### **Contribuciones de los autores**

*Conceptualización:* Loreto Pantoja Manzanarez

*Curación de datos* Alicia Cillo- Mirian Solis- Verónica Delbono:

*Análisis formal:* Rayen Vivero Sun

*Supervisión:* Rayen Vivero Sun

*Investigación:* Lorena Binfá Esbir:

*Metodología:* Lorena Binfá Esbir:

*Redacción – borrador original:* Maribel Mella Guzmán

*Redacción – revisión y edición:* Alicia Carrasco Parra

### **Financiación**

Este proyecto fue financiado por la Confederación Internacional de Matronas (ICM) financiando este estudio a través del fondo concursable “ICM Research Award 2016”.